

## Übungsblatt 5

### Aufgabe 1

Beantworten Sie folgende Fragen durch Anwenden des Markierungsalgorithmus:

(a) Welche der folgenden Formeln sind erfüllbar?

(1)  $(\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge \neg C \wedge A \wedge D \wedge (\neg D \vee B)$

(2)  $(C \vee \neg A) \wedge (\neg A \vee D \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg D \vee \neg E \vee F) \wedge A \wedge \neg F$

(b) Welche der folgenden Formeln sind gültig?

(1)  $(\neg B \wedge C) \vee C \vee (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B) \vee \neg A$

(2)  $(A \wedge D \wedge \neg I) \vee (B \wedge \neg D \wedge E) \vee (\neg A \wedge B \wedge C \wedge H) \vee (\neg E \wedge F) \vee (\neg C \wedge F) \vee (G \wedge \neg H) \vee \neg B \vee \neg F \vee \neg G \vee I$

(c) Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

(1)  $\neg C \vee \neg D \vee E, A, \neg A \vee C \vee \neg B \models E \vee \neg B$

(2)  $A \vee \neg B \vee \neg D, \neg B \vee \neg G \vee F, \neg A \vee E \vee \neg C \vee \neg F, B, D \models E \vee \neg G \vee (\neg C \wedge D)$

### Aufgabe 2

Seien  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0, 1\}$  zwei Belegungen. Wir schreiben  $\mathcal{B}_1 \leq \mathcal{B}_2$  genau dann, wenn für alle  $A \in \{A_1, \dots, A_n\}$  gilt: Wenn  $\mathcal{B}_1(A) = 1$ , dann auch  $\mathcal{B}_2(A) = 1$ . Außerdem sei  $\text{inf}(\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2): \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0, 1\}$  definiert als  $\text{inf}(\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)(A) = \mathcal{B}_1(A) \wedge \mathcal{B}_2(A)$  für  $A \in \{A_1, \dots, A_n\}$ , wobei  $\wedge: \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$  die Und-Funktion ist. Sei  $F$  eine Formel mit den atomaren Formeln  $\{A_1, \dots, A_n\}$ . Ein Modell  $\mathcal{B}: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0, 1\}$  für  $F$  heißt *kleinstes Modell für  $F$* , wenn für alle anderen Modelle  $\mathcal{B}': \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0, 1\}$  für  $F$  gilt, dass  $\mathcal{B} \leq \mathcal{B}'$ .

(a) Zeigen Sie, dass  $\text{inf}(\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2) \leq \mathcal{B}_1$  und  $\text{inf}(\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2) \leq \mathcal{B}_2$  für zwei beliebige Belegungen  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0, 1\}$ .

(b) Sei  $F$  eine Hornformel mit atomaren Formeln  $\{A_1, \dots, A_n\}$ . Zeigen Sie, dass für alle  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2: \{A_1, \dots, A_n\} \rightarrow \{0, 1\}$  gilt: Wenn  $\mathcal{B}_1 \models F$  und  $\mathcal{B}_2 \models F$ , dann gilt auch  $\text{inf}(\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2) \models F$ .

(c) Geben Sie eine Formel an, zu der keine äquivalente Hornformel existiert.

(d) Zeigen Sie, dass jede erfüllbare Hornformel  $F$  ein kleinstes Modell besitzt.

(e) Ändern Sie den Markierungsalgorithmus aus der Vorlesung so ab, dass er Folgendes tut: Die Eingabe ist nach wie vor eine Hornformel  $F$ . Wenn  $F$  unerfüllbar ist, dann gib „unnerfüllbar“ aus. Wenn  $F$  erfüllbar ist, dann liefer das kleinste Modell von  $F$ .