Universität Siegen
Lehrstuhl Theoretische Informatik
Markus Lohrey

Übungsblatt 8

Aufgabe 1. Gegeben sei der Transitionsgraph $T(P)$ auf Folie 216 und die LTL-Formel $\varphi = (0 \wedge 1)\,\mathsf{U}\,(\neg 0 \wedge 1)$. Geben Sie einen P-Multiautomaten M an mit

$$L(M) = \{ru \in \{p,q\}A^* \mid (T(P), ru) \not\models \varphi\}.$$

Aufgabe 2. Eine Menge $B \subseteq A$ in einer Quasiordnung $(A, \leq)$ heißt *Antikette*, wenn für alle $a, b \in B$ mit $a \neq b$ gilt $a \not\leq b$ und $b \not\leq a$. Geben Sie für jedes $n \geq 0$ eine Antikette in $(\mathbb{N}^2, \leq)$ der Größe n an.

Aufgabe 3. Welche der folgenden Quasiordnungen sind Wohlquasiordnungen?

(a) $(\mathbb{N}, |)$, wobei $|$ die Teilbarkeitsrelation ist

(b) $(\mathbb{N}^\omega, \leq)$, wobei $(a_1, a_2, \dots) \leq (b_1, b_2, \dots)$ gilt, wenn $a_i \leq b_i$ für alle $i \geq 1$

(c) $(\{a,b\}^*, \leq_{\mathsf{pre}})$, wobei $u \leq_{\mathsf{pre}} v$ gilt, wenn u Präfix von v ist

(d) $(\{a,b\}^*, \leq_{\mathsf{lex}})$, wobei $u \leq_{\mathsf{lex}} v$ gilt, wenn $u \leq_{\mathsf{pre}} v$ oder (es existieren $x, y, z \in \{a,b\}^*$ mit $u = xay$ und $v = xbz$)

(e) $(\{a,b\}^*, \leq_{\mathsf{llex}})$, wobei $u \leq_{\mathsf{llex}} v$ gilt, wenn $|u| < |v|$ oder ($|u| = |v|$ und $u \leq_{\mathsf{lex}} v$)

(f) Die Teilgraphrelation auf der Menge der endlichen Graphen

Aufgabe 4. Sei Σ ein endliches Alphabet und $\preceq$ die Teilwortrelation auf Σ^*, d.h. $u \preceq v$, wenn $u = a_1 \cdots a_n$ und $v \in \Sigma^* a_1 \Sigma^* a_2 \cdots \Sigma^* a_n \Sigma^*$. Es ist bekannt, dass $(\Sigma^*, \preceq)$ eine Wohlquasiordnung ist (Higman, 1952). Sei $L \subseteq \Sigma^*$ eine beliebige Sprache. Zeigen Sie, dass $\uparrow L$ regulär ist.